

Colocación de EPP del KIT1 en pacientes sospechosos o con COVID-19

(Actividades que generan aerosoles)

Área de colocación de EPP en el servicio


- 1** Retire todos los **elementos** personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc).



- 2** Realice el adecuado **lavado de manos** con agua y jabón con los 12 pasos durante 40 a 60 segundos según los pasos de la OMS.



- 3** Póngase el **traje de mayo limpio y zapatos cerrados**.





- 4** Pase al **área de colocación** de elementos de protección personal(EPP).

- 5** Haga una **inspección visual** verificando que se encuentren todos los EPP y sean del tamaño y calidad apropiada.

- 6** Inicie el procedimiento al **frente del espejo**.

- 7** Póngase la **mascarilla N95** sujetándola por las tiras con la mano no dominante, apoyado en la cara y halando las tiras hacia la parte de atrás de la cabeza, dejándolas al nivel de las orejas y ajustar la banda flexible en el puente nasal.



- 8** Acomodeselo en la cara y debajo del mentón

- 9** Verifique el ajuste o sellado de la mascarilla

- 10** Coloque sobre la mascarilla N95 la **mascarilla quirúrgica o convencional**. *



- 11** Colóquese las **monogafas**.



- 12** Colóquese el **gorro** asegurando que el cabello este recogido.



En el sitio donde se realizará el procedimiento

- 13** Colóquese la **careta**



- 14** Colóquese la **bata antifluído** atando la parte de la cintura primero y luego el cuello, se recomienda hacer un nudo que se pueda desatar de manera fácil.



- 15** Coloque los **2 pares de guantes** (de puño a largo sobre el puño de la bata).



- ▶ Mantenga las manos alejadas de la cara.
- ▶ Limite el contacto con superficies.
- ▶ Cambie los guantes si se rompen o están demasiado contaminados.
- ▶ Realice frecuentemente higiene de manos.



*Expire con fuerza, si este se escapa aire alrededor de la cara debe ajustar la posición y tensión de los tirantes.

El traje, la bata, las mascarillas y gorro deben ser cambiados de manera diaria.

Las monogafas y la careta tienen una duración de 6 meses o pueden ser reemplazadas cuando se deterioren o se dañen, deben ser limpiadas y desinfectadas en cada turno.

Retiro de EPP del KIT1 en pacientes sospechosos o con COVID-19


(Actividades que generan aerosoles)

En el sitio donde se realiza el procedimiento:

- 1** Retire todos los elementos en las zonas asignadas. Asegúrese de que haya **caneca roja**.




- 2** Retire el primer par de guantes con la **técnica apropiada** y deséchelos en la **caneca roja** del cubículo del paciente.



- 3** Al salir del área, retire la **Bata antifluído** desatando el nudo de la cintura y luego el del cuello halando la manga hacia delante de manera suave dejándola en el cubículo.



- 4** Retire el **segundo par de guantes** con la técnica apropiada y los desecha.



- 5** Retire la **careta** y límpiela con amonio cuaternario con toalla de microfibra.



Al finalizar la jornada:

- 6** Retire el **gorro** de adelante hacia atrás.




- 7** Retire las **monogafas** y límpiela con amonio cuaternario con toalla de microfibra.



- 8** Retire el **traje de mayo**.



- 9** Retire la **maskarilla facial** o **quirúrgica** y deséchela.



- 10** Retire la **maskarilla N.95** y deséchela en la caneca roja.



Recuerda que al terminar la jornada o salir del servicio, deberá hacer cambio de ropa y tapabocas.

*Expire con fuerza, si este se escapa aire alrededor de la cara debe ajustar la posición y tensión de los tirantes.

*El traje, la bata, las mascarillas y gorro deben ser cambiados de manera diaria.

*Las monogafas y la careta: tienen una duración de 6 meses o pueden ser reemplazadas cuando se deterioren o se dañen, deben ser limpiadas y desinfectadas en cada turno.

Colocación de EPP del KIT2 en pacientes sospechosos o con COVID-19

(Actividades con baja probabilidad de generación de aerosoles)

Área de colocación de EPP en el servicio

1 Retire todos los **elementos** personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc).



2 Realice el adecuado **lavado de manos** con agua y jabón con los 12 pasos durante 40 a 60 segundos según los pasos de la OMS.



3 Póngase el **traje de mayo limpio** y **zapatos cerrados**.



4 Pase al **área de colocación** de elementos de protección personal(EPP).

5 Haga una **inspección visual** verificando que se encuentren todos los EPP y sean del tamaño y calidad apropiada.

6 Inicie el procedimiento al **frente del espejo**.

7 Pongase la **mascarilla quirúrgica o convencional** lo más pegada a la cara. Sujete las cintas o coloque los elásticos de forma que quede adherido al rostro pero a su vez permita respirar normalmente.



8 Acomodeselo en la cara y debajo del mentón.

9 Verifique el ajuste o sellado de la mascarilla.

10 Colóquese las **monogafas**.*



11 Colóquese el **gorro** asegurando que el cabello este recogido.



En el sitio donde se realizará el procedimiento

12 Colóquese la **bata antifluído** atando la parte de la cintura primero y luego el cuello, se recomienda hacer un nudo que se pueda desatar de manera fácil.*



13 Coloque los **2 pares de guantes** (de puño a largo sobre el puño de la bata).



- ▶ Mantenga las manos alejadas de la cara.
- ▶ Limite el contacto con superficies.
- ▶ Cambie los guantes si se rompen o están demasiado contaminados.
- ▶ Realice frecuentemente higiene de manos.



*El traje, la bata, las mascarillas y gorro: deben ser cambiados de manera diaria.

*Las monogafas: tienen una duración de 6 meses o pueden ser reemplazadas cuando se deterioren o se dañen, deben ser limpiadas y desinfectadas en cada turno.

Retiro de EPP del KIT2 en pacientes sospechosos o con COVID-19

(Actividades con baja probabilidad de generación de aerosoles)

En el sitio donde se realizó el procedimiento:

- 1** Retire todos los elementos en las zonas asignadas. Asegúrese de que haya **caneca roja**.




- 3** Al salir del área, retire la **Bata antifluído** desatando el nudo de la cintura y luego del cuello halando la manga hacia delante de manera suave dejándola en el cubículo.




 **Aplique gel antibacterial**

- 2** Retire el primer par de guantes con la **técnica apropiada** y deséchelos en la **caneca roja** del cubículo del paciente.



- 4** Retire el **segundo par de guantes** con la técnica apropiada y los desecha.



 **Lavado de manos: 60 a 40 seg**

Al finalizar la jornada:

- 5** Retire el **gorro** de adelante hacia atrás.



 **Aplique gel antibacterial**

- 6** Retire las **monogafas** y límpiela con amonio cuaternario con toalla de microfibra.



 **Aplique gel antibacterial**

- 7** Retire el **traje de mayo**.



 **Aplique gel antibacterial**

- 8** Retire la **maskarilla facial** o **quirúrgica** y deséchela.



 **Lavado de manos: 60 a 40 seg**

Recuerda que al terminar la jornada o salir del servicio, deberá hacer cambio de ropa y tapabocas.

Colocación de EPP en pacientes sospechosos o con COVID-19 con overol (Actividades que generan aerosoles)

Área de colocación de EPP en el servicio


- 1** Retire todos los **elementos** personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc)



- 2** Realice el adecuado **lavado de manos** con agua y jabón con los 12 pasos durante 40 a 60 segundos según los pasos de la OMS.



- 3** Póngase el **traje de mayo limpio** y **zapatos cerrados**.



- 4** Pase al **área de colocación** de elementos de protección personal(EPP).

- 5** Haga una **inspección visual** verificando que se encuentren todos los EPP y sean del tamaño y calidad apropiada.

- 6** Inicie el procedimiento al **frente del espejo**.

- 7** Colóquese el **overol**.



- 8** Colóquese las **polainas** (opcional)



- 9** Póngase la **maskarilla N95** sujetándola por las tiras con la mano no dominante, apoyado en la cara y halando las tiras hacia la parte de atrás de la cabeza, dejándolas al nivel de las orejas y ajustar la banda flexible en el puente nasal.



- 10** Acomodeselo en la cara y debajo del mentón

- 11** Verifique el ajuste o sellado de la maskarilla*



- 12** Coloque sobre la maskarilla N95 la **maskarilla quirúrgica o convencional**.



- 13** Colóquese las **monogafas**.



- 14** Colóquese el **gorro** asegurando que el cabello este recogido y subir la **capota**.



En el sitio donde se realizará el procedimiento

- 15** Colóquese **careta**.



- 16** Coloque la **bata antifluído**.



- 17** Coloque los **2 pares de guantes** (de puño a largo sobre el puño de la bata).



- ▶ Mantenga las manos alejadas de la cara.
- ▶ Limite el contacto con superficies.
- ▶ Cambie los guantes si se rompen o están demasiado contaminados.
- ▶ Realice frecuentemente higiene de manos.
- ▶ El uso de bata, careta y doble guante será en actividades que generan contacto con el paciente o su entorno.
- ▶ Durante la utilización del overol evite comer, ir al baño, salir del servicio

*Expire con fuerza, si este se escapa aire alrededor de la cara debe ajustar la posición y tensión de los tirantes.

*El traje, la bata, las maskarillas y gorro: deben ser cambiados de manera diaria.

*Las monogafas y la careta: tienen una duración de 6 meses o pueden ser reemplazadas cuando se deterioren o se dañen, deben ser limpiadas y desinfectadas en cada turno.

Retiro de EPP en pacientes sospechosos o con COVID-19 con overol


(Actividades que generan aerosoles)

En el sitio donde se realizó el procedimiento:

- 1** Retire todos los elementos en las zonas asignadas. Asegúrese de que haya **caneca roja**.



- 2** Retire el primer par de guantes con la **técnica apropiada** y deséchelos en la **caneca roja** del cubículo del paciente.



- 3** Al salir del área, retire la **Bata antifluído** desatando el nudo de la cintura y luego el del cuello halando la manga hacia delante de manera suave dejándola en el cubículo.



 **Aplique gel antibacterial**

- 4** Retire el **segundo par de guantes** con la técnica apropiada y los desecha.




 **Lavado de manos: 60 a 40 seg**

- 5** Retire la **careta** y límpiela con amonio cuaternario con toalla de microfibra.



 **Aplique gel antibacterial**

- 6** Proceda a **retirar el overol y polainas** bajando la cremallera suave, ingresa la mano derecha por dentro del overol hacia el brazo izquierdo retirando de adentro hacia afuera y viceversa dejando la manga al revés, sin contacto con la parte externa, tratando de hacer un rollo a medida que va bajando.



 **Aplique gel antibacterial**

- 7** Retire el **gorro** de adelante hacia atrás.



 **Aplique gel antibacterial**

- 8** Retire las **monogafas** y límpiela con amonio cuaternario con toalla de microfibra.



 **Aplique gel antibacterial**

- 8** Retire el **traje de mayo**.



 **Aplique gel antibacterial**

- 9** Retire la **maskarilla facial** o **quirúrgica** y deséchela.



 **Aplique gel antibacterial**

- 10** Retire la **maskarilla N.95** y deséchela en la caneca roja.



 **Lavado de manos: 60 a 40 seg**

Recuerda que al terminar la jornada o salir del servicio, deberá hacer cambio de ropa y tapabocas.

Colocación de EPP del KIT3 en pacientes sospechosos o con COVID-19

- 1** Realice el adecuado **lavado de manos** con agua y jabón con los 12 pasos durante 40 a 60 segundos según los pasos de la OMS.



- 2** Haga una **inspección visual** verificando que se encuentren todos los EPP y sean del tamaño y calidad apropiada.



- 3** Pongase la **maskarilla quirúrgica o convencional** lo más pegada a la cara. Sujete las cintas o coloque los elásticos de forma que quede adherido al rostro pero a su vez permita respirar normalmente.



- 4** Acomodeselo en la cara y debajo del mentón.

- 5** Verifique el ajuste o sellado de la maskarilla.

- 6** Colóquese las **monogafas**.*



- 7** Recuerde realizar el adecuado **lavado de manos** con agua y jabón cada 3 horas, con los 12 pasos durante 40 a 60 segundos según los pasos de la OMS.



MONOGAFAS




TAPABOCAS



LAVADO DE MANOS



ZAPATOS CERRADOS



Retiro de EPP del KIT3 en pacientes sospechosos o con COVID-19

- 1** Retire las **monogafas** y límpiela con amonio cuaternario con toalla de microfibra.



 **Aplique gel antibacterial**

- 2** Retire la **maskarilla facial o quirúrgica** y deséchela.



 **Lavado de manos: 60 a 40 seg**

- 3** Recuerde realizar el adecuado **lavado de manos** con agua y jabón cada 3 horas, con los 12 pasos durante 40 a 60 segundos según los pasos de la OMS.



MONOGAFAS



TAPABOCAS



LAVADO DE MANOS



ZAPATOS CERRADOS

